

Żmija zygzakowata!!



Jedyny w Polsce gatunek węża jadowitego!!

Jest częściowo chroniony.

Kryje się w wykrotach, pod zwalonymi pniami drzew, na wilgotnych łąkach, obrzeżach lasów, wśród kamieni, w nasłonecznionych miejscach blisko zbiorników wodnych. Dobrze pływa.

Oczy	czerwone/pomarańczowe z pionową źrenicą!!
Zęby jadowe	osadzone w górnej szczęce
Głowa	splaszczona, kształtem przypominająca serce
Kolor	szary, brązowo-rudy, czarny, z wyraźnym zygzakiem o zabarwieniu ciemniejszym od podstawowego

JAK SIĘ CHRONIĆ??

- Do lasu czy na łąkę **ubierać pełne wysokie obuwie**, najlepiej skórzane.
- Żmije atakują tylko wtedy, gdy czują się zagrożone odcięciem drogi ucieczki, nagłym zbliżeniem, dotknięciem kijem lub nogą.
- Patrząc pod nogi, zawsze uprzednio obejrzyć miejsce, gdzie chce się usiąść lub oprzeć rękami, nie dotykać, nie zaczepiać żmii, pozwolić jej uciec.
- Żmija przed ukąszeniem najpierw głośno syczy. To powinno być dla człowieka ostrzeżeniem.

O B J A W Y U K A S Z E N I A

Ogólne:

- osłabienie, senność
- mdłości, wymioty, bóle brzucha, biegunka
- poty, dreszcze, gorączka
- uczucie drętwienia, znieczulenia, np. wokół ust
- wzmożone pragnienie
- obrzęk twarzy, węzłów chłonnych
- tętno słabe, niemiernowe, niewyczuwalne, zaburzenia świadomości

Miejscowe:

- typowa ranka kluta
- narastający, rozchodzący się obrzęk
- ból w miejscu ukąszenia
- zaczerwienienie, zasinienie
- zmiany na skórze, wykwit, wysypka
- krwawienie z rany (rzadko)



Ukąszenie jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci i osób starszych.



Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Wejherowie

Co robić?! PIERWSZA POMOC

1



2



3



1. Zadbaj o własne bezpieczeństwo.
Wezwij pogotowie ratunkowe (może to zrobić inna osoba wyznaczona do pomocy).
2. Obmyj ukąszenie najlepiej solą fizjologiczną NaCl 0,9% lub wodą z mydłem.
3. Kończynę unieruchomij, ułóż poniżej poziomu serca.
Schładzaj miejsce zranienia np.: zimnymi kompresami.

Monitorować czynności życiowe (przytomność, oddech) do czasu przyjazdu pogotowia.

Czego NIE wolno robić?!



- Nie masować, nie uciskać, nie nacinać miejsca ukąszenia
- Nie odsysać ustami



- Nie stosować opaski uciskowej!!



- Nie podawać alkoholu, leków „cucących”,
- Nie podawać surowicy przeciw jadowi żmij bez decyzji lekarza.



Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Wejherowie